

Pęcherzyca –

Pęcherzyca – to choroba objawiająca się występowaniem na skórze i błonach śluzowych, pęcherzy różnej wielkości. Nie są one bolesne, ale w maksymalnym stopniu utrudniają pacjentom proste czynności życiowe. Pęcherze występują w kilku postaciach, np.:

- 1- pęcherzyca zwykła,
- 2- pęcherzyca rumieniowata,
- 3- pęcherzyca liściasta.
- 4- pęcherzyca noworodków – najbardziej trudna do wyleczenia.

Na Foto ręki prawej, u 80-letniej pacjentki widoczne są liczne pęcherze: „młody” na palcu wskazującym, „dojrzały” na grzbiecie ręki i gojące się w okolicy nadgarstka.



Etiologia pęcherzycy – nie jest znana, ma ona podłoże autoimmunologiczne, występują przeciwciała klasy **IgG** skierowane przeciw antygenom powierzchniowym komórek kolczystych. Przebieg choroby jest – **przewlekły**. Pęcherze pojawiają się w różnych okolicach ciała, ale najczęściej na dłoniach i stopach. Obserwuje się gorszy poziom higieny u tych pacjentów lub - zaniedbania w pielęgnacji niepełno - sprawnych, albo u chorych leżących np. po wylewie krwi..

Foto-1a & b: - noga prawa, po stronie przedniej pęcherz o wymiarach: 5x3cm,
- oraz powiększenie..,
- **ciemny kolor skóry - pacjentka jest chora na cukrzycę,**




Pacjentka w wieku 66 lat, leczona z powodu długo (6 miesięcy) i trudno gojącej się rany powyżej kostki na przedniej powierzchni podudzia. Na widoczny pęcherz obok rany, położono tampon **Tubulex**, „przy okazji” – podobnie przykryto go cienką folią zabezpieczając **Tubulex** przed parowaniem. Pęcherz był wypełniony płynem. Nie wykonano punkcji pęcherza i absorpcji płynu. Nie przerwano też błony pęcherza celowo, ani też przypadkowo.

Rozpoczęcie leczenia przy pomocy tamp. **Tubulex**.

Po tygodniu stosowania 3x dziennie opatrunków z tamp. **Tubulex**, płyn tkankowy został samoistnie - zresorbowany, nastąpiło *spłaszczenie się pęcherza* a następnie zrośnięcie się naskórka z tkanką podskórną.

*Foto-5: podudzie po 1 tyg. stosowania **Tubulex**: zmniejszenie się rany oraz spłaszczenie pęcherza.*

Foto-6: powiększenie spłaszczonego pęcherza, po 10 dniach – już bez płynu.



Porównać też należy zdj. pleców i pod pachą, które zostały wykonane podczas // wizyty:

Foto-5: pod tamp. **Tubulex wygórowanie** (ostatni pęcherz), inne są już spłaszczone po prawej stronie i zmniejszona powierzchnia stanu zapalnego,

Foto-6: podobnie pod lewą pachą: pęcherz uległ spłaszczeniu i zmniejszeniu się, podobnie jak na plecach, a obecnie widoczna jest tylko „zmiana na skórze...”



Powiększona zmiana plecach...

- oraz pod pachą.



Powiększona - „zmiana na skórze - na plecach”



Widoczny pęcherz - przykryty tamponem **Tubulex** - w trakcie leczenia.



Te dwa „przypadki” - bez powikłań, mogą jedynie być zachętą do dalszych obserwacji, testów i ewentualnych następnie badań, gdyby inne metody i próby zawiodły...-?

Pozdrawiam Czytelników - Jan Zuchowski dr n med.

Dystrybutor **Tubulex** w Polsce – **Zuchowski-Dental** spzoo. - Szczecin.

Tel: 91 4690 163,

e: biuro@zuchowskidental.pl